

ОТВЕТЫ И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ

Задача 1.

Найдите наибольшее целое число, не превосходящее $\sqrt{2019 \cdot 2029 - 2016 \cdot 2032}$. **Ответ:** 6

Найдите наибольшее целое число, не превосходящее $\sqrt{2019 \cdot 2031 - 2017 \cdot 2033}$. **Ответ:** 5

Найдите наибольшее целое число, не превосходящее $\sqrt{2019 \cdot 2009 - 2007 \cdot 2021}$. **Ответ:** 4

Найдите наибольшее целое число, не превосходящее $\sqrt{2019 \cdot 2007 - 2006 \cdot 2020}$. **Ответ:** 3

Задача 2.

Найдите $a + b + c$, если известно, что $a + 2b = 3$, $b + 2c = 4$, $c + 2a = 5$. **Ответ:** 4

Найдите $a + b + c$, если известно, что $a + 3b = 2$, $b + 3c = 4$, $c + 3a = 6$. **Ответ:** 3

Найдите $a + b + c$, если известно, что $a + 2b = 4$, $b + 2c = 5$, $c + 2a = 6$. **Ответ:** 5

Найдите $a + b + c$, если известно, что $a + 3b = 1$, $b + 3c = 2$, $c + 3a = 5$. **Ответ:** 2

Задача 3.

Решите уравнение $7 \sin x + 2 \cos 2x = 5$. **Ответ:** $x = \pi/2 + 2k\pi$, $(-1)^k \arcsin \frac{3}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

Решите уравнение $5 \sin x + 3 \cos 2x = 4$. **Ответ:** $x = (-1)^k \pi/6 + k\pi$, $(-1)^k \arcsin \frac{1}{3} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

Решите уравнение $7 \sin x + 4 \cos 2x = 3$. **Ответ:** $x = \pi/2 + 2k\pi$, $(-1)^{k+1} \arcsin \frac{1}{8} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

Решите уравнение $5 \sin x + 7 \cos 2x = 6$. **Ответ:** $x = (-1)^k \pi/6 + k\pi$, $(-1)^{k+1} \arcsin \frac{1}{7} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

Задача 4.

Решите неравенство $2^{\log_2^2 x} + 7x^{\log_2 x} < 16$. **Ответ:** $\frac{1}{2} < x < 2$

Решите неравенство $3^{\log_3^2 x} + 5x^{\log_3 x} < 18$. **Ответ:** $\frac{1}{3} < x < 3$

Решите неравенство $7^{\log_7^2 x} + 2x^{\log_7 x} < 21$. **Ответ:** $\frac{1}{7} < x < 7$

Решите неравенство $5^{\log_5^2 x} + 3x^{\log_5 x} < 20$. **Ответ:** $\frac{1}{5} < x < 5$

Задача 5.

На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC отмечены точки D и E таким образом, что $AD : DB = BE : EA = 1 : 4$. Найдите AB , если известно, что площадь треугольника ABC равна 18, а тангенс угла $\angle DCE$ равен $5/3$.

Ответ: 9

На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC отмечены точки D и E таким образом, что $AD : DB = BE : EA = 1 : 5$. Найдите AB , если известно, что площадь треугольника ABC равна 30, а тангенс угла $\angle DCE$ равен 2.

Ответ: 12

На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC отмечены точки D и E таким образом, что $AD : DB = BE : EA = 1 : 6$. Найдите AB , если известно, что площадь треугольника ABC равна 42, а тангенс угла $\angle DCE$ равен $5/2$.

Ответ: 14

На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC отмечены точки D и E таким образом, что $AD : DB = BE : EA = 1 : 7$. Найдите AB , если известно, что площадь треугольника ABC равна 56, а тангенс угла $\angle DCE$ равен 3.

Ответ: 16**Задача 6.**

Найдите все пары вещественных чисел (a, b) , при которых неравенство

$$2a(x+2)^4 + 9b(x-2)^4 \geq x^4 + 24x^2 + 16$$

справедливо для всех вещественных x .

Ответ: $a \geq \frac{1}{4}, b \geq \frac{1}{18}$

Найдите все пары вещественных чисел (a, b) , при которых неравенство

$$3a(x+3)^4 + 8b(x-3)^4 \geq x^4 + 54x^2 + 81$$

справедливо для всех вещественных x .

Ответ: $a \geq \frac{1}{6}, b \geq \frac{1}{16}$

Найдите все пары вещественных чисел (a, b) , при которых неравенство

$$4a(x+2)^4 + 7b(x-2)^4 \leq x^4 + 24x^2 + 16$$

справедливо для всех вещественных x .

Ответ: $a \leq \frac{1}{8}, b \leq \frac{1}{14}$

Найдите все пары вещественных чисел (a, b) , при которых неравенство

$$5a(x+3)^4 + 6b(x-3)^4 \leq x^4 + 54x^2 + 81$$

справедливо для всех вещественных x .

Ответ: $a \leq \frac{1}{10}, b \leq \frac{1}{12}$

Задача 7.

Плоскость π проходит через три вершины прямоугольного параллелепипеда, отсекая от него тетраэдр. Два шара максимально возможных радиусов находятся внутри сферы, описанной около этого параллелепипеда, по разные стороны от плоскости π . Найдите отношение радиусов этих шаров, если известно, что рёбра параллелепипеда равны $1, \sqrt{2}, 2$. **Ответ:** $9 : 5$

Плоскость π проходит через три вершины прямоугольного параллелепипеда, отсекая от него тетраэдр. Два шара максимально возможных радиусов находятся внутри сферы, описанной около этого параллелепипеда, по разные стороны от плоскости π . Найдите отношение радиусов этих шаров, если известно, что рёбра параллелепипеда равны $1, 2, 4$. **Ответ:** $25 : 17$

Плоскость π проходит через три вершины прямоугольного параллелепипеда, отсекая от него тетраэдр. Два шара максимально возможных радиусов находятся внутри сферы, описанной около этого параллелепипеда, по разные стороны от плоскости π . Найдите отношение радиусов этих шаров, если известно, что рёбра параллелепипеда равны $1, \sqrt{3}, 3$. **Ответ:** $8 : 5$

Плоскость π проходит через три вершины прямоугольного параллелепипеда, отсекая от него тетраэдр. Два шара максимально возможных радиусов находятся внутри сферы, описанной около этого параллелепипеда, по разные стороны от плоскости π . Найдите отношение радиусов этих шаров, если известно, что рёбра параллелепипеда равны $1, \sqrt{5}, 5$. **Ответ:** $18 : 13$

Задача 8.

Найдите все x, y из интервала $(-\pi, \pi]$, удовлетворяющие системе уравнений

$$\begin{cases} 10\sqrt{6} \sin x + 5 \sin y + 4\sqrt{3} \sin \frac{x+y}{2} = 6\sqrt{6} \\ 5 \sin x \sin y + 4\sqrt{3} \sin x \sin \frac{x+y}{2} + \sqrt{2} \sin y \sin \frac{x+y}{2} = \frac{6\sqrt{6}}{5} \end{cases}$$

Ответ: $(x, y) = (\arcsin \frac{1}{5}, \arccos \frac{1}{5}), (x, y) = (\pi - \arcsin \frac{1}{5}, \pi - \arccos \frac{1}{5})$

Найдите все x, y из интервала $(-\pi, \pi]$, удовлетворяющие системе уравнений

$$\begin{cases} 28\sqrt{3} \cos x + 7 \cos y + 4\sqrt{6} \cos \frac{x+y}{2} = 12\sqrt{3} \\ 7 \cos x \cos y + 4\sqrt{6} \cos x \cos \frac{x+y}{2} + \sqrt{2} \cos y \cos \frac{x+y}{2} = \frac{12\sqrt{3}}{7} \end{cases}$$

Ответ: $(x, y) = (\arccos \frac{1}{7}, \arcsin \frac{1}{7}), (x, y) = (-\arccos \frac{1}{7}, -\arcsin \frac{1}{7})$

Найдите все x, y из интервала $(-\pi, \pi]$, удовлетворяющие системе уравнений

$$\begin{cases} 24\sqrt{7} \sin x + 8 \sin y + 3\sqrt{14} \sin \frac{x+y}{2} = 9\sqrt{7} \\ 8 \sin x \sin y + 3\sqrt{14} \sin x \sin \frac{x+y}{2} + \sqrt{2} \sin y \sin \frac{x+y}{2} = \frac{9\sqrt{7}}{8} \end{cases}$$

Ответ: $(x, y) = (\arcsin \frac{1}{8}, \arccos \frac{1}{8}), (x, y) = (\pi - \arcsin \frac{1}{8}, \pi - \arccos \frac{1}{8})$

Найдите все x, y из интервала $(-\pi, \pi]$, удовлетворяющие системе уравнений

$$\begin{cases} 36\sqrt{5} \cos x + 9 \cos y + 4\sqrt{10} \cos \frac{x+y}{2} = 12\sqrt{5} \\ 9 \cos x \cos y + 4\sqrt{10} \cos x \cos \frac{x+y}{2} + \sqrt{2} \cos y \cos \frac{x+y}{2} = \frac{4\sqrt{5}}{3} \end{cases}$$

Ответ: $(x, y) = (\arccos \frac{1}{9}, \arcsin \frac{1}{9}), (x, y) = (-\arccos \frac{1}{9}, -\arcsin \frac{1}{9})$

ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ

1. Найдите наибольшее целое число, не превосходящее $\sqrt{2019 \cdot 2029 - 2016 \cdot 2032}$.

Решение: $\sqrt{2019 \cdot 2029 - 2016 \cdot 2032} = \sqrt{(2024^2 - 5^2) - (2024^2 - 8^2)} = \sqrt{8^2 - 5^2} = \sqrt{39}$. Остаётся заметить, что $6^2 < 39 < 7^2$.

Ответ: 6

2. Найдите $a + b + c$, если известно, что $a + 2b = 3$, $b + 2c = 4$, $c + 2a = 5$.

Решение: $a + b + c = \frac{1}{3}((a + 2b) + (b + 2c) + (c + 2a)) = \frac{1}{3} \cdot 12 = 4$.

Ответ: 4

3. Решите уравнение $7 \sin x + 2 \cos 2x = 5$.

Решение:

$$\begin{aligned} 7 \sin x + 2 \cos 2x = 5 &\iff 7 \sin x + 2 - 4 \sin^2 x = 5 \iff 4 \sin^2 x - 7 \sin x + 3 = 0 \iff \\ &\iff \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = \frac{3}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pi/2 + 2k\pi, \\ x = (-1)^k \arcsin \frac{3}{4} + k\pi, \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ответ: $x = \pi/2 + 2k\pi, (-1)^k \arcsin \frac{3}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

4. Решите неравенство $2^{\log_2^2 x} + 7x^{\log_2 x} < 16$.

Решение:

$$\begin{aligned} 2^{\log_2^2 x} + 7x^{\log_2 x} < 16 &\iff 2^{\log_2^2 x} + 7 \cdot 2^{\log_2^2 x} < 16 \iff 2^{\log_2^2 x} < 2 \iff \\ &\iff \log_2^2 x < 1 \iff -1 < \log_2 x < 1 \iff \frac{1}{2} < x < 2. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{1}{2} < x < 2$

5. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC отмечены точки D и E таким образом, что $AD : DB = BE : EA = 1 : 4$. Найдите AB , если известно, что площадь треугольника ABC равна 18, а тангенс угла $\angle DCE$ равен $5/3$.

Решение: Положим $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$. Опустим из точек D и E на сторону AC перпендикуляры DK и EL соответственно. Пусть $AD : DB = BE : EA = 1 : n$ (по условию $n = 4$). Тогда

$$\operatorname{tg} \angle ACE = \frac{EL}{CL} = \frac{\frac{n}{n+1}a}{\frac{1}{n+1}b} = \frac{na}{b}, \quad \operatorname{tg} \angle ACD = \frac{DK}{CK} = \frac{\frac{1}{n+1}a}{\frac{n}{n+1}b} = \frac{a}{nb}.$$

Стало быть,

$$\operatorname{tg} \angle DCE = \operatorname{tg}(\angle ACE - \angle ACD) = \frac{\frac{na}{b} - \frac{a}{nb}}{1 + \frac{na}{b} \cdot \frac{a}{nb}} = \frac{n^2 - 1}{n} \cdot \frac{ab}{a^2 + b^2} = \frac{n^2 - 1}{n} \cdot \frac{2S(\triangle ABC)}{c^2},$$

$$\text{откуда } c = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{n} \cdot \frac{2S(\triangle ABC)}{\operatorname{tg} \angle DCE}} = \sqrt{\frac{15}{4} \cdot \frac{36}{5/3}} = 9.$$

Ответ: 9

6. Найдите все пары вещественных чисел (a, b) , при которых неравенство

$$2a(x+2)^4 + 9b(x-2)^4 \geq x^4 + 24x^2 + 16$$

справедливо для всех вещественных x .

Решение: Заметим, что $(x+2)^4 + (x-2)^4 = 2(x^4 + 24x^2 + 16)$. Стало быть, исходное неравенство можно переписать как

$$(2a - \frac{1}{2})(x+2)^4 + (9b - \frac{1}{2})(x-2)^4 \geq 0.$$

Подставляя $x = 2$ и $x = -2$, получаем $2a - \frac{1}{2} \geq 0$ и $9b - \frac{1}{2} \geq 0$. Остаётся заметить, что при выполнении этих ограничений наше неравенство выполняется для всех x . Следовательно, искомые значения параметров a и b описываются неравенствами $a \geq \frac{1}{4}$, $b \geq \frac{1}{18}$.

Ответ: $a \geq \frac{1}{4}$, $b \geq \frac{1}{18}$

7. Плоскость π проходит через три вершины прямоугольного параллелепипеда, отсекая от него тетраэдр. Два шара максимально возможных радиусов находятся внутри сферы, описанной около этого параллелепипеда, по разные стороны от плоскости π . Найдите отношение радиусов этих шаров, если известно, что рёбра параллелепипеда равны $1, \sqrt{2}, 2$.

Решение: Пусть π_1 и π_2 — две касательные плоскости к сфере, параллельные π , и пусть T_1 и T_2 — соответствующие точки касания. Тогда центр сферы O совпадает с серединой отрезка T_1T_2 . Пусть T — точка пересечения T_1T_2 с плоскостью π . Пусть \mathcal{B}_1 — шар, находящийся между π_1 и π , а \mathcal{B}_2 — шар, находящийся между π_2 и π . Тогда диаметры \mathcal{B}_1 и \mathcal{B}_2 не могут превышать расстояния между π_1 и π и между π_2 и π соответственно. Причём равенство достигается ровно в одном случае — когда отрезки TT_1 и TT_2 суть соответственно диаметры \mathcal{B}_1 и \mathcal{B}_2 . Следовательно, искомое отношение равно TT_1/TT_2 . Не ограничивая общности, можно считать, что $TT_1 \geq TT_2$. Тогда, если обозначить через R радиус сферы и через r — расстояние от точки O до плоскости π , то

$$\frac{TT_1}{TT_2} = \frac{R+r}{R-r} = \frac{R/r+1}{R/r-1}.$$

Найдём R/r .

Пусть A, B, C — вершины параллелепипеда, через которые проходит плоскость π , и пусть D — четвёртая вершина отсекаемого тетраэдра. Пусть $AD = a$, $BD = b$, $CD = c$. Поскольку плоскость π делит диагональ параллелепипеда, исходящую из вершины D , в отношении $1:2$, расстояние от O до π в два раза меньше расстояния от D до π . Стало быть, объём тетраэдра $ABCD$ равен одновременно $\frac{1}{3} \cdot 2r \cdot S(\triangle ABC)$ и $\frac{1}{6}abc$. Для площади $S(\triangle ABC)$ справедливо

$$S(\triangle ABC) = \sqrt{S(\triangle ABD)^2 + S(\triangle BCD)^2 + S(\triangle ACD)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}((ab)^2 + (bc)^2 + (ac)^2)},$$

то есть

$$r = \frac{abc}{4S(\triangle ABC)} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}}.$$

Учитывая, что $R = OD = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$, получаем

$$R/r = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}} = \sqrt{1+2+4} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = 7/2.$$

Стало быть, искомое отношение равно

$$\frac{TT_1}{TT_2} = \frac{7/2 + 1}{7/2 - 1} = 9/5.$$

Ответ: 9 : 5

8. Найдите все x, y из интервала $(-\pi, \pi]$, удовлетворяющие системе уравнений

$$\begin{cases} 10\sqrt{6} \sin x + 5 \sin y + 4\sqrt{3} \sin \frac{x+y}{2} = 6\sqrt{6} \\ 5 \sin x \sin y + 4\sqrt{3} \sin x \sin \frac{x+y}{2} + \sqrt{2} \sin y \sin \frac{x+y}{2} = \frac{6\sqrt{6}}{5} \end{cases}.$$

Решение: Положим $a = 5 \sin x$, $b = \frac{5}{2\sqrt{6}} \sin y$, $c = \sqrt{2} \sin \frac{x+y}{2}$. Тогда исходная система примет вид

$$\begin{cases} a + b + c = 3 \\ ab + ac + bc = 3 \end{cases}.$$

Тогда $2(a+b+c)^2 - 6(ab+ac+bc) = 0$. Но $2(a+b+c)^2 - 6(ab+ac+bc) = (a-b)^2 + (b-c)^2 + (a-c)^2$. Следовательно, $a = b = c = 1$. Получаем

$$\sin x = \frac{1}{5}, \quad \sin y = \frac{2\sqrt{6}}{5}, \quad \sin \frac{x+y}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Заметим, что $\arcsin \frac{2\sqrt{6}}{5} = \arccos \frac{1}{5}$. Стало быть,

$$x \in \left\{ \arcsin \frac{1}{5}, \pi - \arcsin \frac{1}{5} \right\}, \quad y \in \left\{ \arccos \frac{1}{5}, \pi - \arccos \frac{1}{5} \right\}, \quad \frac{x+y}{2} \in \left\{ \pi/4, 3\pi/4, \right\}.$$

Данным трём условиям удовлетворяют только пары

$$(x, y) = \left(\arcsin \frac{1}{5}, \arccos \frac{1}{5} \right) \quad \text{и} \quad (x, y) = \left(\pi - \arcsin \frac{1}{5}, \pi - \arccos \frac{1}{5} \right).$$

Ответ: $(x, y) = \left(\arcsin \frac{1}{5}, \arccos \frac{1}{5} \right), (x, y) = \left(\pi - \arcsin \frac{1}{5}, \pi - \arccos \frac{1}{5} \right)$